



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Parasola plicatilis (Curtis : Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple

Synonyme : *Coprinus plicatilis*

Nom français : Coprin plissé

En pelouses et prairies. Peu déliquescent. Chapeau brun roux fauvâtre, puis pâlisant en gris blanchâtre ; le centre reste roux et est suivi d'une zone orangée ce qui donne alors un aspect tricolore au chapeau. Lames nettement libres. Stipe blanc. Spores 10-14,5 x 6,5-10,5 µm, mitriformes de face. A comparer avec :

- *P. leioccephala* : chapeau devenant bicolore, spores légèrement plus petites ;
- *P. lilatincta* : parmi les copeaux de bois, chapeau lilacin, rapidement grisonnant, les teintes lilacines persistant seulement au centre, spores 9,5-13,5 x 6-11 µm, cheilocystides à contenu huileux grisâtre ;
- *P. kuehneri* : surtout en milieu humide et spores nettement inférieures.

Espèce fréquemment observée et visible chaque année, parfois dès le printemps, puis l'été et l'automne.

Biblio : littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompodium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 298 - Mille et un champignon P. Roux.



