



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinellus impatiens (Fr. : Fr.) J. Lange

Synonyme : *Coprinus impatiens*

Au sol, en forêt. Chapeau brun au disque, marge pâle. Stipe blanc. Spores 9-12 x 5-7,5 µm, ovoïdes, à pore germinatif central. Voile absent sur le chapeau qui présente des soies piléiques à col atténué. Cheilocystides lagéniformes à sommet pointu, pleurocystides absentes. A comparer notamment avec :

- *C. hiascens* : voile fugace, spores moins larges et à base tronquée, cheilocystides moins en pointe ;
- *C. heterothrix* : lames plus espacées, voile fugace (filamenteux ramifié), piléocystides et caulocystides plus cylindriques.

Coprin qu'il est possible de rencontrer occasionnellement, mais difficile à déterminer comme de nombreuses espèces de la Section *Setulosi*, exigeant une microscopie complète et pas toujours réalisable en l'absence d'une récolte bien conservée et surtout de jeunes exemplaires.

Biblio : Littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrard Ludwig, Pilzkompodium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin).