



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

***Descolea tenuipes var. rheophylla*** (Bertault & Malençon) Neville & Poumarat

Synonymes : *Setchelliogaster rheophyllus*

Sous *Eucalyptus*. Chapeau brun rougeâtre à briqueté. Lames brun rouillé, plissées à mal formées et parfois plus ou moins anastomosées. Stipe ochracé. Spores 12,5-19 x 7,5-11 µm à sommet mamelonné. Présence de cheilocystides capitées.

Par le passé, cette espèce a fait couler beaucoup d'encre et a été à l'origine de plusieurs genres, espèces ou variétés, selon que les champignons étaient hypogés (dans le sol, avec lames non formées) ou épigés (hors sol), il est reconnu aujourd'hui qu'il s'agit d'une seule et même espèce. A comparer avec :

- *D. tenuipes* : spores non ou peu mamelonnées, cystides absentes ou rares ;
- *D. tenuipes var. rheophylla f. oblongispora* : spores nettement allongées.

Ce *Descolea* n'est pas rare dans son écologie, il faut souvent savoir le dénicher sous les feuilles et les branches où il est plus ou moins enfoui dans le sol (comme évoqué ci-dessus), d'où son aspect « mal fichu » typique. Nous l'avons observé dans de nombreux secteurs des îles de Ré et d'Aix, mais aussi à l'intérieur des terres à Ste Gemme, Saintes, etc.

Biblio : Bull. SMF 120 p. 51-71.





