



Ordre : Tricholomatales

Famille : Tricholomataceae

Arrhenia griseopallida (Desmazières : Fr.) Watling

Synonymes : *Phaeotellus griseopallidus*, *Omphalina griseopallida* (plus var. *tetraspora*)

Nom français : Omphale gris pâle

En pelouses moussues, sur bords de routes, dunes, etc. Chapeau gris-brun sombre. Lames brunes, irrégulières, fourchues et décourtes. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur souvent légèrement pélargoniée. Spores 8-12 x 5-7 µm à tendance parfois larmiformes. Basides bi- ou tétrasporiques. Boucles présentes aux cloisons des hyphes. A comparer avec trois espèces très ressemblantes :

- *A. obscurata* : inodore, lames bien formées, spores moins larmiformes (nous ne sommes pas vraiment à l'aise pour distinguer ce taxon...);
- *A. settii* : boucles absentes, spores nettement plus petites (5,5-6,5 x 3-3,5 µm);
- *A. rickenii* : boucles absentes, lames nettement fourchues et anastomosées.

Sans être très fréquente, cette espèce est visible presque chaque année et à différentes périodes, nous l'avons observée sur terre, sur sable et parmi les mousses dans différents secteurs de Charente-Maritime et Charente.

Biblio : littérature courante.







*Pessines,
mars 2013*



*Pessines,
mars 2013*

