



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

## *Myxomphalia maura* (Fr. : Fr.) Hora

Nom français : Omphale des charbonnières


Sur places à feu. Chapeau brun, gris-brun à gris-noir, hygrophane, centre ombiliqué, marge striée et enroulée ; cuticule gélatineuse, élastique. Lames décourbées, également élastiques, blanches puis gris blanchâtre. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur et saveur nulles à farineuses. Spores 5-6,5 x 4-5  $\mu$ m, amyloïdes. Présence de cheilocystides.

A noter l'existence de *M. maura* var. *invita* qui distingue des exemplaires trompeurs à chapeau pâle. Avec une écologie similaire, à comparer également avec :

- *Lyophyllum ambustum* et *L. anthracophilum* : chapeau non creusé, cuticule non gélatineuse et spores non amyloïdes ;
- *Faerberia carbonaria* : lames fourchues et présence de cystides incrustées.

Espèce peu fréquente à nos yeux puisque nous n'en avons que quelques récoltes, à ce jour toutes réalisées durant les mois de novembre et décembre en forêt de La Coubre, par exemple dans les secteurs du Galon d'Or et de la Pointe Espagnole. A noter que le brûlé peut être ancien et avoir plus ou moins disparu sous d'autres mousses colonisatrices.

Biblio : GEPR.



**eau**



**melzer**



**cheilos**

