



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

## *Lepiota felina* (Pers.:Fr.)Karsten

Surtout sous conifères. Chapeau blanc plus ou moins couvert de squamules brun noirâtre à calotte sombre. Lames blanc blanchâtre. Base du stipe avec squamules concolores à celles du chapeau, anneau gris-brun à la face infère. Odeur dite « d'huile de cèdre » ou « pélargoniée ». Spores 6-8,5 x 3,5-4,5  $\mu\text{m}$ . Poils piléiques fusiformes 200-300  $\mu\text{m}$  avec sous-couche hyméniforme nette. A comparer avec quelques espèces plus ou moins ressemblantes :

- *L. lilacea* : teintes lilacines, spores 4,5-5,5 x 2,5-3  $\mu\text{m}$  et hyphes piléiques clavées 35-50  $\mu\text{m}$  ;
- *L. cristata* et *L. griseovirens* : spores éperonnées.

Espèce probablement peu fréquente dans notre région, la seule que nous ayons à présenter à ce jour a été réalisée en compagnie de nos amis Yvonne et Guy Mauget, parmi les aiguilles de cèdres dans une plantation à Bédénac, les spores observées mesuraient 7,5-8,3 x 3,5-4  $\mu\text{m}$ .

Biblio : littérature courante - DM HS n° 3 Lepiotaecae - GEPR p. 320.