



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula convivialis Sarnari

Sous feuillus, souvent sous chênes. Chapeau 20-40 mm, sec et opaque, brun châtain à brun vineux, décolorant par le centre qui est plus ou moins ochracé, souvent piqueté de rouille, cuticule nettement séparable, marge peu cannelée. Lames moyennement serrées, ochracées à maturité. Stipe blanchâtre, ferme au départ puis creux en vieillissant, faiblement jaunissant par la base. Odeur sans particularité et saveur douce. Gaïac vif et rapide, Fer rosâtre. Sporée 4a. Spores 6,5-8,5 x 5,5-7,5 µm pouvant être plus ou moins réticulées. Dermatocystides simples ou cloisonnés.

Espèce de la section *Tenellae* et de la sous-section *Rhodellinae*, probablement peu fréquente, mais comme il en est fait mention dans la littérature, paraissant difficile à cerner tant la macroscopie et la microscopie peuvent être assez variables. Notre récolte a été réalisée en juillet 2013 dans les bois de Fontcouverte, nous remercions vivement les collègues qui nous ont mis sur la piste de cette espèce récemment décrite (1994) et encore peu connue.

Biblio : *Russula Sarnari* tome 2 p. 1211 - Bull. SMF 123 (1), p. 11-28.