



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

## *Russula parazurea* J. Schaeffer

Noms français : Russule presque bleue, Russule bleu-vert

Sous feuillus ou conifères, plutôt sur sol siliceux. Chapeau pruineux, souvent mat, gris bleuté à gris-vert, plus ou moins violacé ou olivâtre, mais parfois plus pâle et alors assez trompeur. Lames crème à maturité. Stipe blanc, parfois violeté lilacin. Odeur nulle, saveur douce à légèrement âcre dans les lames. Sporée 2a. Spores 6-8,5 x 5-6,5 µm subréticulées à presque totalement réticulées.

Espèce assez bien caractérisée, incluant la *forme dibapha* (cf. Sarnari). En cas de doute, notamment en présence d'exemplaires à cuticule un peu luisante, à comparer par exemple avec *R. anatina*, *R. atroglauca*, *R. ionochlora* et *R. aeriginea*.

Cette russule est absente de nombreuses forêts de la région qui sont sur sol calcaire, par contre, nous la rencontrons assez régulièrement, entre les mois de juillet et d'octobre, dès l'instant où nous prospectons des milieux plus acides.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.





