



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Boletus fechtneri Velenovsky

Nom français : Bolet de Fechtner

Calcicole. Chapeau pâle, crème grisâtre. Pores jaunes, bleuissants. Stipe jaunâtre, cerné de rose rougeâtre dans la zone médiane ou basse, couvert d'un fin réseau concolore assez étendu. Une coupe montre une chair blanchâtre jaunâtre, bleuissant dans le chapeau (surtout juste au-dessus des tubes) et rosâtre à la base du stipe. Spores 11-15 x 4,5-6 µm. A comparer notamment avec :

- *B. pseudoregius* : chapeau plus sombre, rosâtre puis brun avec l'âge, et bleuissement de la chair sur l'ensemble du chapeau (cf. photographie page 3) ;
- *B. appendiculatus* : chapeau à dominante brune, brun rouge, brun rosâtre à brun jaune, stipe sans teintes roses, chair ne bleuissant pas ou que très subtilement au-dessus des tubes.
- *B. subappendiculatus* : sosie de *B. appendiculatus*, vient sous conifères montagnards (épicéa et sapins).

Si les conditions météorologiques sont favorables, dans notre région, il est possible de rencontrer ce bolet tous les ans sur ses terrains de prédilection, donc sur sol calcaire. Sa période de poussée semble être, comme pour tous les bolets thermophiles, l'été et le début d'automne.

Biblio : littérature courante.





B. fechtneri,
à gauche,
bleuissement
juste au-dessus
des tubes.

B. pseudoregius,
à droite,
bleuissement
dans tout le
chapeau.

