



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius cisticola Frøslev & T. S. Jeppesen

Synonyme : *C. calochrous* var. *carolii* ss. auct.

Sous Cistacées ou feuillus, sur sol calcaire. Chapeau visqueux, uniformément jaune à jaune ochracé, souvent avec de petites plaques de voile blanchâtre au centre. Lames lilas à bleu violacé puis ochracé rouillé. Stipe blanchâtre, violacé au sommet, avec un bulbe marginé, voile blanc ou brunâtre. Chair blanchâtre, bleutée dans le stipe. Odeur et saveur sans particularité. KOH brunâtre rosâtre sur la cuticule, nul sur chair, rose-rouge sombre sur le bord du bulbe. Spores 10-11 x 6-7 μ m. A comparer avec :

- *C. chailluzii* : chapeau jaune brillant vers la marge et ochracé brun au centre, spores légèrement moins larges ;
- *C. calochrous* : voile et mycélium jaune ;
- *C. barbarorum* : sous conifères.

Dans la même Section *Calochroi* et pouvant ressembler, voir les fiches de *C. nymphicolor* et *C. platypus*.

Espèce peut-être plus fréquente que nous pourrions le penser dans nos sous-bois clairs de feuillus calcicoles, souvent avec chênes verts.

Biblio : littérature courante - ADC Bidaud et al.- GEPR.