



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius tabularis (Fr. : Fr.) Fr.

Sous feuillus, souvent sous bouleaux. Chapeau brun argilacé, brun-jaune ochracé à jaune grisâtre, parfois fortement ridé. Lames beiges à bleu-gris puis ochracées. Stipe blanc à bleuté au sommet, puis ochracé, voile peu copieux, base un peu dilatée. Chair blanchâtre. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-9 x 5,5-7 μm , un peu moins globuleuses que chez d'autres espèces de la même Ss.-section *Anomali*.

A comparer par exemple avec *C. lepidopus* qui a un chapeau sombre et feutré, et un stipe guirlandé de voile jaune ochracé.

A noter l'existence de *C. rugosus*, taxon décrivant des cortinaires à chapeau radialement ruguleux, voire cannelés ; mais ce caractère semble être sans valeur spécifique, d'ailleurs il ne serait qu'un synonyme de *C. anomalus* selon des études biomoléculaires récentes.

Nos récoltes ont été réalisées sous bouleaux et saules, parfois parmi les sphaignes, dans les bois de Massignac et Brigueuil (16). Les spores observées mesuraient 6,5-8 x 5,5-6,5 μm . Nous remercions vivement les collègues qui nous ont apporté leur vision scientifique de ces espèces, nous permettant ainsi de trancher, et de baptiser précisément ces cortinaires probablement peu communs dans notre région.

Biblio : ADC Bidaud et al. - Flora photographica.