



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Lyophyllaceae*

## ***Calocybe gambosa*** (Fr. : Fr.) Singer

Synonyme : *Tricholoma georgii*

Noms français : Tricholome de la Saint-Georges, Mousseron

Au printemps. En prairies, dans les haies, parfois en forêt ; souvent en cercles. Chapeau blanc, beige ochracé, jaune ou brunâtre. Lames très serrées, blanches. Stipe blanc à crème. Odeur et saveur fortement farineuses. Spores 5-7 x 3-4 µm.

A noter que différentes variétés ont été décrites en fonction de la couleur du chapeau, par exemple *C. gambosa* var. *flavida* qui pourrait distinguer la récolte ci-dessus aux chapeaux nettement jaunes, mais il s'agit tout simplement d'une seule espèce aux couleurs variables selon les mycéliums.

Difficile à confondre, à comparer malgré tout avec plusieurs entolomes (lames roses à maturité) printaniers : *E. saundersii*, *E. clypeatum*, *E. niphoides* ...

Ce tricholome est assez répandu, mais il est souvent peu visible car camouflé dans la végétation, de plus ses lieux de pousse privilégiés (haies notamment) sont en voie de raréfaction.

Biblio : littérature courante.

