



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

## *Inocybe putilla* Bres.

Sous feuillus, souvent sous noisetiers. Chapeau 1-3 cm, fibrillo-vergeté à rimeux, remarquablement dissocié, brun jaunâtre à brun rougeâtre, centre plus sombre. Lames beiges puis brunâtres. Stipe prineux au sommet, fibrilleux en dessous, pâle puis beige brunâtre par détersion. Odeur faible, un peu spermatique à herbacée à la coupe. Spores (7)7,5-9,5(12) x 5,5-7 µm, nettement bossues. Cheilocystides métuloïdes fusiformes à lagéniformes ventruës, à contenu granuleux. Caulocystides métuloïdes peu nombreuses au sommet du stipe.

*Inocybe* de la Section *Cortinatae* stirpe *Boltonii* qui n'est pas sans rappeler ceux du groupe *Rimosa*.

Cette espèce semble peu fréquente. La récolte présentée à gauche a été réalisée en août 2015 à Montendre et celle à droite en juin 2017 en forêt de La Braconne. Nous remercions vivement M. Alain Ferville, qui nous a confirmé que nous étions bien en présence de cette espèce (dont l'amplitude des dimensions sporales pourrait dérouter, mais souvent inférieures à celles annoncées dans le DM 111) en nous rappelant l'existence de son article publié en 2003.

Biblio : DM 111 p. 12 - *Miscellanea Mycologica* n° 77 (2003) A. Ferville.

*Fiche réalisée en juillet 2017 par Patrice TANCHAUD*