



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula pseudoaeruginea (Romagn.) Kuyper & Vuure

Sous feuillus, surtout sous chênes sur sol argilo-calcaire. Chapeau vert olivâtre, centre crème. Cuticule séparable jusqu'à la moitié. Lames blanches, puis crème ochracé. Stipe blanc. Odeur faible, chair douce, lames légèrement âcres. Gaïac nul à subnul sur stipe et lames. Sporée 2c-2d. Spores 6,5-8,5 x 5,5-6,5 µm, verruqueuses et subréticulées. Poils de la cuticule pointus et typiquement élargis en tonnelets, présence de dermatocystides.

A comparer avec :

- *R. stenotricha* : sporée similaire, poils cuticulaires non élargis ;
- *R. medullata* : sporée 3a-3b, spores à verrues isolées ;
- *R. pseudoaeruginea f. galochroa* : forme à chapeau plus pâle, blanchâtre crème teinté de gris verdâtre, souvent taché de rouille.

Il est bien difficile de préciser la fréquence d'une telle espèce tant les différences sont bien ténues dans cette Ss.-Section *Griseinea*. Nous avons récolté cette russule à quelques reprises, en forêt de La Braconne, à St Sornin et aux Essouverts.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.



