



Ordre : *Pluteales*

Famille : *Pluteaceae*

Pluteus pouzarianus Singer

Nom français : Plutée de Pouzar

Sur bois mort de conifères. Chapeau brun sombre, brun-beige à brun-gris, souvent d'aspect « métallique » en séchant, avec des mèches brunes au centre. Lames blanches puis roses. Stipe crème plus ou moins couvert de fibrilles brunes, surtout vers la base. Odeur nulle ou faiblement herbacée à raphanoïde. Spores 6-8 x 4-6 μm . Cystides à crochets sur l'arête et la face des lames. Boucles présentes dans la cuticule. A comparer avec trois espèces également avec boucles :

- *P. alniphilus* : sur feuillu, chapeau gris-brun ;
- *P. primus* : sur conifères, surtout en montagne, printanier, spores 8-10 x 5,5-7 μm , cystides plus grandes ;
- *P. pellitus* : plus petit, chapeau blanc pur et lisse, inodore.

Sans boucles, voir par exemple *P. cervinus* et *P. petasatus*.

L'été ou l'automne, il est possible de rencontrer ce plutée dans la région, sur son écologie de prédilection, mais un contrôle microscopique n'est pas superflu dans ce groupe où les espèces sont proches et parfois délicates à distinguer.

Biblio : littérature courante - DM n° 111 clé du genre *Pluteus* M. Citérin & G. Eyssartier - Funga nordica - Phytotaxa 180 (1), 2014 - GEPR.