



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Helvellaceae*

Gyromitra perlata (Fr.) Harmaja

Synonyme : *Discina perlata*

Au printemps, sur bois de conifères ou débris au sol. Apothécie 3-8(15) cm, vite étalée, plus ou moins veinée, brun rougeâtre à marron, face externe blanc rosâtre à blanchâtre ochracé. Stipe plus ou moins court, épais et plissé. Pas d'odeur particulière. Spores (24)27-30(40) x 12-15 (sans les appendices), finement verruqueuses, légèrement réticulées à maturité, avec 3 guttules dont la centrale plus grosse, et un appendice conique à chaque extrémité.

L'observation des spores n'est pas superflue afin de distinguer quelques espèces proches du même genre (ou du genre *Pachyella*), par exemple :

- *G. geogenia* : généralement avec des teintes olivâtres, spores 18-27 x 9-12 µm, rugueuses, avec apicules arrondis-tronqués ;
- *G. leucoxantha* : jaune ochracé assez vif, spores 25-35 x 10-15 µm, réticulées, avec apicules tronqués.

Ascomycète peu fréquent et rarement signalé dans la région. Nous avons eu le plaisir de le rencontrer à plusieurs reprises, entre les mois de janvier et mars, en différents points du littoral, à La Palmyre et La Bouverie sur la commune des Mathes, ainsi que sur l'île de Ré.

Biblio : BK1 31 - Discomycètes de France, Grelet p. 55.







