Ordre : *Cortinariales* Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius scaurotraganoides Henry

Sous feuillus. Chapeau blanchâtre à grisâtre puis brunâtre, tomenteux à fibrilleux. Lames gris beige à ochracées, puis rouillées. Stipe subconcolore au chapeau, fibrilleux, avec un bulbe plus ou moins marginé. Chair subéreuse, ocre roussâtre. Odeur puissante, dite « d'alcool de poire ». Spores 8,5-10 x 5-5,5 µm.
Avec une nette odeur, plus ou moins proche ou variable, à comparer avec :

- *C. traganus* (syn. *C. finitimus* ss. auct.) : même odeur, sous conifères (sub)montagnards, chapeau lilas violacé (chapeau sans violet dans sa forme *ochraceus*) ;
- *C. niveotraganus* : même odeur, sous bouleaux, chapeau blanchâtre bleuté et hygrophane ;
- *C. camphoratus* : odeur désagréable de corne brûlée, lames violettes, stipe non bulbeux.

A ce jour, nous avons observé ce cortinaire en deux endroits ;

- en forêt de Brigueuil, sous hêtres et chênes ;
- à Ronce les Bains, sous chênes.

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR.

Fiche réalisée en décembre 2024 par Patrice TANCHAUD