



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

***Tricholoma albobrunneum*** (Pers. : Fr.) P. Kumm.

Synonyme : *T. striatum*

Sous conifères et surtout sous pins. Chapeau brun-roux, sombre et terne, fibrilleux, peu visqueux, marge plus ou moins cannelée. Lames blanches, tachées de roux avec l'âge. Stipe blanchâtre roussâtre, avec une zone blanche plus ou moins marquée au sommet. Odeur farineuse, saveur farineuse à légèrement amère. Spores 5-6 x 3-4,5 µm.

Egalement sous pins, avec une chair blanche, à comparer avec quatre espèces à chapeau plus vivement coloré de brun orangé :

- *T. stans* : marge du chapeau un peu plus pâle et cannelée, stipe uniformément coloré de blanc roussâtre sans zone blanche (parfois aussi sous épicéas) ;
- *T. pessundatum* : chapeau avec des guttules sombres vers la marge qui est non cannelée, stipe uniformément coloré de blanc roussâtre sans zone blanche ;
- *T. batschii* : stipe avec un bourrelet glutineux ; - *T. focale* : stipe avec une armille.

Cf. fiche *T. ustaloides* pour les tricholomes brun-roux à chair blanche poussant sous feuillus. Sous cèdres penser à *T. cedretorum*.

Ce tricholome n'est pas rare sur notre littoral atlantique entre les mois d'octobre et de décembre. Nous le connaissons également dans le secteur de Cadeuil commune de Ste Gemme. A noter que par le passé, suite à de nombreuses confusions dans la littérature, nous baptisions de telles récoltes *T. pessundatum*.

Biblio : The Genus *Tricholoma*, Christensen & Heilmann-Clausen - Persoonia 38, 2017: 38–57 - GEPR.

Fiche réalisée en décembre 2017 par Patrice TANCHAUD

