



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula rutila Romagn. ex Romagn.

Nom français : Russule rutilante

Surtout sous chênes. Chapeau 3-10 cm, mat, rouge vif décolorant en crème, ou plus terne et concolore ; cuticule séparable jusqu'à mi-chapeau. Lames blanches puis jaune clair. Stipe blanc occasionnellement teinté de rose sur un côté. Odeur sans particularité, saveur très âcre. Gaïac subnul sur stipe et lames. Sporée 4c. Spores 7,5-9,5 x 6-8 µm avec des verrues isolées à légèrement crêtées. Présence de dermatocystides incrustées, mais parfois peu évidentes.

- Sans réaction également au gaïac, penser à *R. maculata* qui pousse sous chênes sur sol calcaire, son chapeau est taché de rouille et sa saveur est moins âcre.
- Avec une réaction positive au gaïac sur stipe et lames, voir :
 - *R. decipiens* : sporée 4e, stipe grisonnant avec l'âge ;
 - *R. laeta* : sous chênes et hêtres, sporée 4c, saveur douce ;
 - *R. veterrosa* : sous hêtres, sporée 4b, stipe tendant à grisonner.

A noter l'existence de *R. rutila* f. *oxydabilis*, taxon qui se distinguerait du type par une réaction vive au gaïac. Il paraît difficile alors de faire la distinction avec *R. veterrosa*, situation restant à éclaircir...

Cette russule semble peu fréquente dans la région, nous l'avons récoltée par exemple dans les bois de Chalais et d'Essouverts.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.