



Ordre : Pezizales

Famille : Morchellaceae

Morchella dunensis (Castanera Alonso & Moreno) Clowez

Synonyme : *Morchella esculenta* f. *dunensis*

-

Nom français : Morille des dunes

Souvent en milieu dunaire. Chapeau globuleux, ochracé clair à ochracé sale ; alvéoles primaires irréguliers. Stipe blanchâtre puis ochracé, assez court, à base élargie, avec présence d'une carotte mycélienne constituée de nombreux rhizoïdes. Odeur complexe, légèrement désagréable. Spores 20-25 x 11-12 μm .

Ce taxon a fait couler beaucoup d'encre, et la distinction avec *M. vulgaris* et *M. esculenta*, qui affectionnent également la même écologie, est délicate voire impossible sans étude ADN. Pour cette raison, nous n'avons aucune certitude sur le binôme à attribuer à l'exemplaire présenté, d'autant plus que nous avons des échantillons récoltés dans les dunes qui se sont avérés être *M. esculenta* (présentés sur la fiche de ce nom), suite à des analyses phylogénétiques réalisées par M. Philippe Clowez, grand spécialiste du genre, que nous remercions vivement.

A noter également l'existence de *M. dunalii*, espèce liée aux chênes verts et aux pins.

Morille à rechercher dans son écologie de prédilection, mais au moment où nous écrivons ces lignes, nous ignorons donc si elle existe sur notre littoral, elle semble surtout présente au nord de la Bretagne.

Biblio : Champignons des dunes J. Guinberteau - Bull. SMF 126, fasc. 3 & 4, 2010.