



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Morchellaceae*

## *Morchella vulgaris* (Pers.) Boud.

Au printemps, surtout sous frênes. Chapeau variable, souvent trapézoïdal conique, gris-noirâtre, gris cendré, brunâtre, parfois ocre ; alvéoles irréguliers (labyrinthés), non fermés et boursouflés. Stipe blanchâtre puis ochracé, à base souvent élargie. Présence d'une vallécule (espace entre le chapeau et le haut du stipe). Odeur forte, difficile à définir. Spores 19-21 x 10,5-11,5 µm.

Cette espèce est peu présente dans la moitié sud de la France (contrairement à *M. esculenta*), donc, encore plus que pour les autres morilles, elle n'est que rarement visible dans la région. Sa palette de couleurs est très large, ci-dessus à gauche, elle se présente sous un aspect typique ; à droite, avec des teintes ocre, elle n'est pas sans rappeler *M. esculenta*. Nous remercions vivement M. Philippe Clowez, spécialiste du genre, pour toutes les informations qu'il partage fréquemment sur ce genre assez controversé.

Biblio : littérature courante - Bull. SMF 126, fasc. 3 & 4, 2010 - Mycologia, 107(2), 2015, pp. 359-382.