



Ordre : Boletales

Famille : Gomphidiaceae

## *Chroogomphus fulmineus* (Heim) Courtecuisse

Sous pins. Thermophile, méditerranéen, atlantique. Chapeau 10-45 mm, rouge vermillon à orangé très vif. Lames décurrentes, ochracé orangé. Stipe subconcolore au chapeau. Chair gris-vert à gris-noir dans le bas du stipe. Spores (16)19-23 x 6-7,5 µm. Cystides 13-19 µm de largeur.

A comparer avec :

- *C. subfulmineus* : chapeau 4-8 cm moins vivement coloré, cystides 10-25 µm de large ;
- *C. rutilus* : chapeau sans couleurs vives.

A noter également l'existence de *C. mediterraneus* (trame des lames non ou peu amyloïde) et *C. britannicus* (mycélium jaune), espèces probablement souvent confondues et existant peut-être dans notre région ?

Ces gomphides sont fréquents sur le littoral, plus occasionnellement à l'intérieur des terres, notamment l'automne, et parfois à d'autres saisons. Reste à savoir si d'autres espèces parmi quelques-unes citées ci-dessus peuvent exister dans la région... Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire de la récolte présentée page 2.

Biblio : littérature courante - Ima fungus 9(2): 271-290 (2018).



