



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## *Xerocomus badiorufus* (Heim) Bon

En forêt, sur sol siliceux. Chapeau sec et velouté, bai à bai pourpré, marge fortement enroulée bordée d'un fin liseré blanc. Tubes typiquement très courts et décurrents ; pores fins, non bleuissants (ou à peine) au toucher. Stipe plus ou moins réticulé au sommet, fusiforme, renflé ou cylindracé. Chair immuable. Spores 10-12 x 3,5-5 µm.

A noter l'existence de *X. badius f. subimmutabilis* Estadès & Lannoy ad int. (bull. FMDS 174, 2004), qui diffère de *X. badius (Imleria badia)* par les tubes généralement courts, longtemps blancs à blanchâtres, immuables, les pores petits non bleuissants mais grisonnant plutôt au toucher, la chair immuable ou légèrement rosissante.

De l'avis de nombreux mycologues, *X. badiorufus* est un taxon douteux. Par contre, il est intéressant de connaître l'existence d'*Imleria heteroderma*, taxon peu connu à chapeau velouté assez clair (pouvant rappeler celui de *Gyroporus castaneus* ou *Aureoboletus moravicus*).

Par conséquent, il est fort possible que les photographies ci-dessus ne présentent ni plus ni moins qu'une forme d'*Imleria badia* :

- à gauche : novembre 2012 à Montendre, en milieu sablonneux avec majorité pins ;
- à droite : novembre 2012 aux Essouverts à Lozay, sur sol calcaire, avec majorité conifères (*Abies* et *Douglas*) et chênes.

Biblio : DM HS n° 6 - *Xerocomus* H. Ladurner & G. Simonini (indiqué comme taxon douteux).

*Fiche réalisée en décembre 2023 par Patrice TANCHAUD*