



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Helvellaceae*

Helvella latispora Boudier

Synonymes : *Leptopodia latispora* ; *H. stevensii* *ss. auct.* (nom adopté pour des récoltes américaines, sosie de *H. latispora* et peut-être synonyme ? Ne doutons pas que des études biomoléculaires en diront plus dans les années à venir).

Au sol dans les sous-bois. Chapeau selliforme ou à deux lobes, hyménium beige grisâtre, beige ochracé à brunâtre ; surface externe blanche, légèrement furfuracée. Stipe blanc, finement villos sur toute la longueur. Spores 17-21 x 12-14,5 µm (parfois indiquées légèrement plus larges pour distinguer *H. elastica*, mais ce caractère paraît difficile à prendre en compte). A comparer avec :

- *H. elastica* : hyménium gris-brun et surtout le stipe lisse ;
- *H. corbierei* : petite espèce entièrement blanche au départ, chapeau inférieur à 1 cm.

Nous nous sommes souvent posé la question de savoir si nous devons séparer ce binôme d'*H. elastica*, nous pensons pouvoir le faire avec cette récolte réalisée en août 2015 en milieu frais, sous feuillus à Saintes.

Biblio : Planche n° 233 Boudier - Discomycètes de France, Grelet p. 52 - Bull. FMBDS n° 199 (2010) - Pézizales Rhône-Alpes vol. 1.