



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Pleurotaceae*

Hohenbuehelia mastrucata (Fr. : Fr.) Singer

Sur bois mort de feuillus. Chapeau 1-10 cm, réniforme, couvert d'un feutrage gélatineux et écailleux gris-brun parfois un peu violacé, blanchâtre avec l'âge ou en séchant (photographie ci-contre). Lames blanchâtres puis crème jaunâtre. Odeur farineuse, saveur douce. Spores 6-8,5 x 3,5-4,5 µm. Présence sur l'arête des lames de grosses cystides métuloïdes, mêlées à d'autres plus petites avec gliosphex (boule de mucus au sommet). Absence de piléogliosphex.

A comparer avec *H. valesiaca*, taxon sosie qui ne diffère que par la présence de piléogliosphex et par l'épaisseur moyenne de la trame piléique (815 µm contre 310 µm chez *H. mastrucata*).

Espèce assez rare, plutôt bien caractérisée et souvent de grande taille pour le genre. Nous l'avons observée à de rares reprises, sur le littoral et à l'intérieur des terres, toujours l'automne sur peuplier pourrissant. A noter malgré tout que le contrôle de la trame piléique n'est pas chose aisée pour un amateur, par contre l'absence totale de gliosphex dans le revêtement piléique nous a conforté sur le binôme adopté ici.

Biblio : littérature courante - I Generi *Hohenbuehelia* e *Resupinatus* in Europa par Consiglio & Setti.









