



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius cf. flabelloides Carteret

Sous conifères. Chapeau 3-5 cm avec un mamelon aigu à obtus, hygrophane, brun-rougeâtre puis brun ochracé, avec la marge plus pâle voilée de blanchâtre. Lames rouillées à maturité. Stipe blanchâtre à beige pâle, bleuté violacé au sommet, parcouru de fibrilles brunes. Chair gris carné. Odeur terreuse. Spores 8,5-11 x 5-6 μm , moyennement verruqueuses.

Notre récolte a été réalisée en novembre 2018, sous majorité chênes dans les bois de Villiers-Couture. Le chapeau mesurait 4,5 cm, l'odeur était nette et assez complexe, de terreuse à raphanoïde, les spores mesuraient 9-11 x 5,5-7 μm . Ce cortinaire appartient sans nul doute au Sous-genre *Hydrocybe*, et c'est dans la Section *Plumbosi*, Série *Milvinus*, que nous avons plus particulièrement orienté nos recherches, avec des espèces bien délicates à distinguer (mais éliminées au vu de la stature ou de l'odeur différentes), raisons pour lesquelles nous mettons les réserves d'usage sur le binôme adopté, l'écologie par exemple étant différente de celle de la description.

Biblio : ADC Bidaud et al.

Fiche réalisée en février 2019 par Patrice TANCHAUD