



Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Caloboletus calopus f. ereticulatus (Estadès & Lannoy) Blanco-Dios

Synonyme : *Boletus calopus f. ereticulatus*

En forêt, plutôt sur sol calcaire. Chapeau beige grisâtre à brun olivacé. Pores jaunes puis verdâtres. Chair légèrement bleuissante. Saveur amère. Stipe ponctué de rouge ou beige. Spores 12-15 x 4-5 µm. Réaction bleu-vert sur cuticule et chair au contact d'iode (melzer).

A comparer avec :

- *C. calopus* (type) : sur sol acide, stipe non réticulé mais seulement ponctué ;
- *C. polygonius* (syn. *C. polygonius var. ereticulatus*) : souvent en touffe, chapeau tesselé, stipe fusiforme sans réseau, réaction nulle à l'iode.

De nouvelles études, notamment phylogénétiques, s'avéreront indispensables à l'avenir pour tenter d'y voir plus clair à propos de cette forme de *B. calopus* que nous rencontrons occasionnellement dans la région, l'été et l'automne.

Biblio : Bull. FMDS 174 (2004) - DM 121 p. 57 à 61 - DM HS n° 6 - Bull. FMBDS n° 236 (2020).





