



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

## ***Imperator torosus*** (Fr.) Assyov et coll.

Synonyme : *Boletus torosus*

Nom français : Bolet massif

Sous feuillus, notamment chênes ou hêtres, parfois mêlés de conifères. Chapeau jaune dans la jeunesse, virant rapidement en jaunâtre gris sale, brunâtre à gris olivâtre, généralement bariolé de rougeâtre brunâtre à vineux dans les blessures. Pores jaunes puis verdâtres à maturité, rarement avec un peu de rouge, bleuissants au toucher. Stipe jaune à légèrement orangé, maculé comme le chapeau de brun vineux dans les blessures, couvert d'un fin réseau concolore dans la moitié supérieure. Chair jaune bleuissant vivement à la coupe, rouge betterave à la base, ferme et très dense (typiquement très lourde selon la littérature : ce caractère paraissant néanmoins bien difficile à prendre en compte afin de séparer cette espèce de ses voisines). Spores 13,5-15,5 x 5,5-6,5 µm.

A comparer surtout avec *I. rhodopurpureus* f. *xanthopurpureus* (cf. cette fiche).

Dans la région, dès l'instant où une période est favorable aux poussées entre les mois de juillet et d'octobre, ce bolet peut se rencontrer presque tous les ans. Nous l'avons trouvé sous chênes-verts, chênes à feuilles caduques et hêtres mêlés de conifères.

Biblio : littérature courante.















