



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita verna (Bull. : Fr.) Lamarck

Synonyme : *A. verna* var. *decipiens*

Printanier, surtout sous chênes sur sol sablonneux. Chapeau blanc, puis crème ochracé par le centre. Lames blanches. Stipe blanc, lisse, avec un anneau mince ; volve blanche en sac. Odeur faible, puis florale à entêtante désagréable. KOH jaune sur la cuticule. Spores 8-12 x 6,5-9 µm, elliptiques à subglobuleuses.

A comparer avec quelques espèces :

- *A. vidua* (syn. *A. verna* ss. auct.) : véritable sosie également printanier, méditerranéen, KOH négatif ;
- *A. amerivirosa* (syn. *A. virosa* var. *levipes*) : plus tardif mais souvent visible dès le mois de juin puis jusqu'à l'automne, KOH jaune, spores globuleuses ;
- *A. phalloides* f. *alba* : KOH nul, non printanier.

Amanite probablement rare dans la région. Nous remercions vivement M. Pascal Chautrand à qui nous devons la découverte, notre ami l'observe depuis plusieurs années durant le mois de mai en forêt de La Coubre.

Page 2 : une récolte réalisée en mai 2023 en forêt de St Augustin.

Biblio : littérature courante - GEPR - Biology 2022, 11, 770.





