



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

***Clitocella popinalis*** (Fr. : Fr.) Kluting et coll.

Synonyme : *Rhodocybe popinalis*

Dans les milieux herbeux tels que prés, jardins ou clairières, parfois dans les dunes. Chapeau brun ochracé à gris noirâtre, souvent avec quelques fossettes plus sombres. Lames crème grisâtre puis gris brunâtre sombre, décourbées. Stipe concolore au chapeau. Odeur farineuse, saveur très amère. KOH brun-rouge sur cuticule et chair. Spores 5-6,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides absentes.

A comparer avec deux espèces à réaction identique au KOH :

- *C. mundula* : en milieu boisé, chapeau généralement plus clair et ridé craquelé concentriquement ;
- *C. obscura* : sous épicéas en montagne, chapeau et lames gris foncé à noirâtres, spores jusqu'à 7-7,5 µm de long, cheilocystides filiformes tortueuses.

A noter l'existence de *C. colorata*, fort ressemblant à *C. mundula* et poussant également en forêt, mais il ne réagit pas au KOH.

Espèce peu fréquente dont nous avons quelques rares observations sur le littoral. Les récoltes présentées ont été réalisées à la période automnale sur les communes de Chermignac et St Porchaire.

Biblio : littérature courante - GEPR - Persoonia 50, 2023 : 123-157.