



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe tarda Kühner

Synonyme : *I. aurantioumbonata*

Sous pins en milieux sablonneux, à l'intérieur des terres ou sur le littoral (*var. sabulosa*). Chapeau 2-5 cm, fibrilleux à sublisé, brun châtain parfois plus ou moins grisâtre. Lames blanchâtres, brunissant à maturité. Stipe beige rosé à brunâtre. Chair pâle, crème rosé dans le stipe. Spores 9-13 x 5-7 µm. Cheilocystides cylindriques à faiblement utriformes, à parois non ou peu jaunissantes dans l'ammoniaque. Caulocystides métuloïdes au sommet du stipe.

Inocybe pouvant paraître difficile à cerner tant il existe d'espèces gravitant autour, citons par exemple :

- *I. nitidiuscula* : fort ressemblant avec un chapeau mamelonné ;
- *I. rufuloides* : présence de paracystides entre les cheilocystides ;
- *I. pinophila* : spores légèrement plus petites ;
- *I. metrodii* : caulocystides sur toute la longueur du stipe.

Les inocybes sont fréquents et nombreux sur le littoral et c'est probablement le cas pour celui-ci. La récolte présentée page 2 a été réalisée à St Palais sur Mer et a fait l'objet d'une analyse ADN. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : littérature courante - DM n° 108 p. 36 - Inocybe Stangl - Integrative Systematics (nov. 2022).

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD



cheilos



caulos

