



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Agaricaceae*

## *Agaricus lanipes* (F. H. Møller & Jul. Schäff.) Hlaváček

Nom français : Agaric à pied laineux

Dans les lisières de bois et les parcs. Chapeau 5-12 cm, densément couvert de fibrilles brun rougeâtre à brun chocolat, devenant écailleux sur fond clair. Lames brun sombre à maturité. Stipe blanchâtre, lisse au dessus de l'anneau, orné en-dessous de bracelets brunâtres et de squamules floconneuses brunâtres. Chair rougissant faiblement dans le chapeau et le haut du stipe. Odeur d'anis ou d'amande amère à la base du stipe. Spores 6-7,5 x 4-5 µm.

A comparer par exemple avec :

- *A. porphyrocephalus* : stipe non squamuleux sous l'anneau et chair immuable ;
- *A. bresadolanus* : chapeau moins sombre et plus écailleux, anneau non bordé de brun ;
- *A. sylvaticus* et *A. langei* : nettement plus rougissants.

Cet agaric est caractérisé par l'ornementation du bas du stipe, son faible rougissement et son odeur, il est probablement peu fréquent car rarement signalé. Notre récolte a été réalisée en octobre 2022, dans un pré à proximité de chênes, dans le secteur de Brigueuil.

Biblio : littérature courante - Agaricus vol. 1, Parra Sanchez.

*Fiche réalisée en décembre 2022 par Patrice TANCHAUD*