



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

Inocybe amethystina Kuyper

Sous conifères mêlés. Chapeau 1,2-4 cm, fibrillo-squamuleux, brun rougeâtre. Lames brunâtres un peu violacées. Stipe lilacin au sommet, blanchâtre à ochracé dans la moitié inférieure. Spores 8-11 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes, typiquement non ou peu ventrues, à paroi jaunissant nettement dans l'ammoniaque, mêlées à des paracystides clavées. Caulocystides métuloïdes peu nombreuses au sommet du stipe.

Espèce de la Section (assez ingrate) des *Lilacinae*, à comparer avec :

- *I. obscuroides* : taxon controversé et non retenu par certains auteurs, plus gros (chapeau jusqu'à 7 cm) ;
- *I. pusio* : cuticule plus lisse, cystides ammoniaco-négatives ;
- *I. personata* : caulocystides absentes, odeur acidulée à pélargoniée.

Notre récolte a été réalisée en avril 2016 dans une plantation de cèdres à Bédénac, nous remercions vivement les collègues qui se sont exprimés en présence de ces inocybes, permettant ainsi d'envisager de façon assez sereine le binôme décrit ici.

Biblio : DM n° 108 p. 13 - *Inocybe* Stangl.