



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe giovannii Bandini, B. Oertel & U. Eberh.

En forêt, sous conifères ou feuillus, plutôt sur sol calcaire. Chapeau 15-40 mm, couvert d'un voile blanchâtre fugace sur les jeunes exemplaires, ocre brun à roux orangé, tomenteux-laineux à squarreux. Lames blanches puis brun grisâtre. Stipe pruneux et strié sur toute sa longueur, blanchâtre, rosissant et nettement rose rougeâtre au sommet. Chair blanc rosé, odeur spermatique. Spores 7,5-10,5 x 5-7 μm . Cheilocystides lagéniformes à subutriformes à sommet cristallifère, avec les parois qui jaunissent sous l'effet de l'ammoniaque. Caulocystides métuloïdes sur toute la longueur du stipe.

Cet *Inocybe* se place sans difficulté dans la Section *Splendentes*, mais face au grand nombre de taxon qui y sont décrits, il devient difficile de nos jours de s'en sortir sans avoir recours à l'ADN, même pour des mycologues expérimentés, et de surcroît celui-ci vient juste d'être décrit...

Notre récolte a été réalisée en décembre 2024, sous chênes verts et pins sur la commune de Meschers, les chapeaux ne dépassaient pas 3 cm, et les spores contrôlées mesuraient 8-9 x 5-6,5 μm . Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : Persoonia 56, 2026.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD

