




Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe metrodii Stangl & J. Veselský

En forêt. Chapeau 3-6 cm, avec un large mamelon, fibrilleux, brun sombre à brun-roux fauve rougeâtre, marge souvent relevée à maturité. Lames pâles à crème jaunâtre puis ochracées. Stipe blanchâtre, un peu ochracé dans la moitié inférieure, base non ou peu élargie. Chair blanche, odeur sans particularité. Spores 8-11 x 5-7 μm . Cheilocystides fusiformes à clavées à parois épaisses avec le sommet cristallifère. Caulocystides métuloïdes sur l'ensemble du stipe.

A comparer avec :

- *I. glabrescens* : chapeau glabre et mamelonné ;
- *I. tenebrosa* : stipe nettement noircissant dans la moitié inférieure.

Espèce peu connue mais peut-être plus fréquente qu'il n'y paraît, nous l'avons observée sur deux emplacements, l'automne, sous chênes verts et pins dans le secteur de St Palais sur Mer. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage de ces deux récoltes.

Biblio : Česká Mykologie 33(4): 220-224 - DM n° 108 p. 63 - Mycological Progress n° 20 (2021).



caulos



cheilos

