



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae



Inocybe pinophila Cervini, Cagnoli & Bizio

Sous pins en milieux aérés et sablonneux. Chapeau jusqu'à 6 cm, brun châtain, brun rougeâtre à brun orangé, feutré et fibrilleux, couvert d'un voile blanchâtre argenté dans la jeunesse. Lames blanches puis crème brunâtre. Stipe rosé orangé, prumineux et strié sur toute la longueur. Chair rosâtre. Odeur nulle à faiblement spermatique. Spores 8-10 x 5-6,5 µm, ovoïdes. Cheilocystides lagéniformes, ventrues à subfusiformes, à sommet cristallifère. Caulocystides métuloïdes au sommet du stipe.


A comparer avec de nombreuses espèces de la même Section *Tardae*, notamment *I. tarda*, véritable sosie qui montre des spores amygdaliformes à sommet allongé et de dimensions supérieures (10-12 x 5,5-7 µm).

Cet *Inocybe* a été récemment décrit (2024), il n'est probablement pas rare sur notre littoral, d'ailleurs notre ami François Valade l'a récolté à quelques reprises bien avant sa description... (séquençage à l'appui). Notre récolte a été réalisée en janvier 2025, parfaitement dans son écologie sous pins à Marennes, avec l'identité confirmée suite à une analyse ADN. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage d'un exemplaire.

Biblio : RMR Boll. AMER 121(1), 2024.



cheilos



caulos