



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe tigrina Heim

Nom français : Inocybe tigré

En forêt de feuillus, également sous chênes verts ou pins. Chapeau 2-4 cm, vergeté à squamuleux d'aspect plus ou moins « tigré », brun sombre à brun-fauve. Lames pâles à ochracées. Stipe blanchâtre ochracé. Chair pâle. Odeur faible sans particularité, un peu « fongique ». Spores 9-11 x 5-6 µm (donc assez étroites). Cheilocystides fusiformes à lagéniformes à sommet cristallifère. Caulocystides métuloïdes au sommet du stipe.

Taxon de la Ss.-section *Gausapatinae* où les représentants sont parfois difficiles à distinguer, voire synonymisés ou non selon les auteurs. Celui-ci est proche d'*I. flocculosa* (syn. *I. subtigrina*) qui possède un chapeau uniquement fibrilleux-feutré à rimeux.

Cet *Inocybe* peut être reconnaissable lorsque que son chapeau est bien typé, la microscopie en complément n'est néanmoins pas superflue. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris pour le séquençage des trois récoltes présentées, réalisées à Fouras et St Augustin (sous chênes verts) et aux Nouillers (sous chênes et châtaigniers).

Biblio : littérature courante.

