



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe alluvionis Stangl & J. Veselský

En milieu humide, souvent sous peupliers, saules ou aulnes. Chapeau 3-6 cm, brun-roux, brun ochracé jaunâtre à beige jaunâtre, fibrilleux, parfois squamuleux au centre à maturité. Lames blanchâtres puis brun grisâtre. Stipe blanc pouvant se tacher d'ochracé, totalement pruineux, avec la base bulbeuse plus ou moins marginée. Chair blanche, odeur herbacée acidulée. Spores 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides ventruës à cylindracées avec le sommet cristallifère. Caulocystides métuloïdes sur toute la longueur du stipe.

A comparer avec :

- *I. splendens* : peut-être plus submontagnard, chapeau un peu visqueux souvent avec des particules de terre, plus brun rougeâtre foncé pouvant avoir des teintes orangées ou violacées, marge nettement fissurée par temps sec, base du stipe bulbeuse, spores souvent étirées au sommet ;
- *I. terrifera* : en milieu frais, souvent associé au chêne, chapeau un peu visqueux souvent avec des particules de terre, ochracé avec par endroits des restes de voile blanchâtre, base du stipe peu bulbeuse, spores à sommet obtus étiré.

Ce groupe de trois inocybes a souvent fait débat, aujourd'hui, le recours à l'analyse ADN commence à éclaircir la situation et maintient leur séparation.

Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé au séquençage de deux récoltes réalisées à Salles sur Mer, présentées pages 1 & 2.

Biblio : littérature courante - Česká Mykol. 30 (2) : 77 (1976) - DM 108 p. 54.

Fiche réalisée en juillet 2026 par Patrice TANCHAUD



