Ordre : *Cortinariales* Famille : *Hymenogasteraceae*

Hebeloma cistophilum Maire

Nom français : Hébélome des cistes

Sous cistes. Chapeau brun châtain à ochracé, marge plus claire. Lames brunâtres. Stipe légèrement cortiné, blanchâtre, brunissant par la base avec l'âge. Odeur et saveur raphanoïdes. Spores 10-12 x 6-7 µm non ou très faiblement dextrinoïdes. Cheilocystides lagéniformes.
A comparer avec :
- *H. cavipes* et *H. erumpens* (chapeau bicolore) *H. plesiocistum* (chapeau unicolore à peu bicolore) : également sous cistes, stipe non cortiné et spores plus ou moins dextrinoïdes ;
- *H. mesophaeum* : véritable sosie à saveur amère et spores légèrement plus petites.

Cet hébélome pousse en grand nombre où son écologie de prédilection est présente, sur sol sablonneux à l'intérieur des terres ou sur le littoral, par exemple avec présence de *Cistus salvaefolius*.

Biblio : littérature courante - The Genus Hebeloma Jan Vesterholt - Fungi Europaei 14 Beker, Eberhardt & Vesterholt (2016) - GEPR.

Fiche réalisée en janvier 2018 par Patrice TANCHAUD