



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Pleurotaceae*

## *Pleurotus cornucopiae* (Paulet) Rolland

Nom français : Pleurote corne d'abondance

Sur bois de feuillus, généralement au printemps et l'été. Chapeau blanchâtre, beige à brunâtre, en entonnoir. Lames blanchâtres, longuement décurrentes en filets anastomosés jusqu'à la base du stipe. Odeur forte. Spores 7-11 x 3,5-5,5  $\mu\text{m}$ .

A comparer avec :

- *P. pulmonarius* : plutôt estival, couleurs pâles, stipe peu développé et sans réseau, odeur un peu anisée ;
- *P. ostreatus* : plutôt hivernal, couleurs plus sombres, stipe court ou subnul, sans réseau, avec la base poilue ;
- *Lentinellus inolens* : en touffe, chapeaux beige ochracé, arête des lames denticulée ; - *Lentinellus cochleatus* : odeur anisée.

Champignon fréquent il y a quelques décennies, surtout sur les ormes, mais que nous rencontrons de moins en moins vu la disparition de cette essence ; il devient donc difficile de l'observer chaque année. Sa période d'apparition, selon ce que nous avons pu remarquer, se situe entre les mois d'avril et de septembre/octobre.

Biblio : littérature courante.











