



Ordre : *Leotiales*

Famille : *Hyaloscyphaceae*

Dematioscypha dematiicola (Berk. & Broome) Svrček

Synonyme : *Hyaloscypha dematiicola*

Sur branches pourrissantes de feuillus (hêtre, chêne). Fructifications 0,2-0,4 mm, sessiles, poussant parmi les sporanges hirsutes du stade imparfait (*Haplographium*). Hyménium grisâtre. Marge et face externe garnies de poils blanchâtres. Spores 5,5-9 x 2-2,5 µm, avec des petites guttules et une cloison centrale à maturité. Asques 40-55 x 5,5-8 µm, avec crochet à la base.

A comparer avec :

- *D. olivacea* : spores avec des petites guttules, base des asques sans crochet ;
- *D. richonis* : spores avec une guttule à chaque extrémité (parfois une troisième au milieu), base des asques avec crochet.

Ascomycète de très petite taille, difficile à repérer à l'œil nu. Nous l'avons toujours rencontré sur bois de feuillus en présence du stade imparfait, par exemple :

- en forêt de Bois Long (Braconne) sur la commune de Bunzac (16), le 23 avril 2006 ;
- en forêt de Mervent (85) lors d'une sortie commune SMMA, le 29 septembre 2007.

Biblio : BK1 239.