



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Pleurotaceae*

## *Resupinatus trichotis* (Pers.) Singer

Sur bois de feuillus ou de conifères. Chapeau cupuliforme à marge régulière, jusqu'à 1,3 cm, grisâtre pâle à brun noirâtre, présentant vers l'insertion un fort tomentum noir qui envahit le chapeau avec l'âge (il peut être invisible au départ car inséré dans le substrat). Lames gris-brun puis noirâtres à arête blanche. Pseudostipe absent. Spores 5-6 x 4-5,5 µm. Cheilocystides coralloïdes mêlées à des formations cristallines.

A comparer avec :

- *R. applicatus* : chapeau plus large à marge rapidement irrégulière (festonnée/cannelée), présence d'un pseudostipe, tomentum blanchâtre, grisâtre ou gris-brun à maturité ;
- *R. striatulus* : sur conifères, chapeau lisse, longuement strié, spores oblongues.

A ce jour, toutes nos récoltes ont été observées sur bois de feuillu, entre les mois de juillet et décembre. Cette espèce n'est pas très rare, nous l'avons trouvée dans de nombreux secteurs de la région.

Biblio : littérature courante - Mille et un champignons P. Roux - I generi Hohenbuehelia e Resupinatus in Europa Consiglio & Setti.