



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Clitocella blancii (Maire) Consiglio

Synonymes : *Rhodocybe* et *Clitopilus blancii*, *Clitopilus ochraceopallidus*, *Rhodocybe ochraceopallida*

Sur sol sablonneux, surtout sous conifères. Chapeau 2-7 cm, prumineux dans la jeunesse, ocre alutacé, gris-brun à jaune pâle ou ocre rosé. Lames décurrentes, crème jaunâtre à reflets rosâtres à maturité. Stipe subconcolore au chapeau mais plus pâle. Odeur faible à fruitée ou farineuse à la coupe. Saveur farineuse, souvent avec de l'amertume mais parfois sans. KOH nul. Spores 5-6 x 3,5-4,5 µm, finement bosselées. Cheilocystides absentes.

A comparer avec :

- *Clitocella fallax* : chapeau blanc sale à crème ochracé pâle, spores légèrement plus longues et moins subglobuleuses ;
- *Clitocella popinalis* : KOH brun-rouge sur cuticule.

Nous avons longtemps hésité pour adopter le binôme ici décrit, mais le comparatif des espèces citées ci-dessus et la littérature récente nous confortent dans ce choix. Ces exemplaires ont été récoltés en octobre 2012 sur l'île de Ré.

Biblio : GEPR - Persoonia 50, 2023 : 123-157.

Fiche réalisée en juillet 2023 par Patrice TANCHAUD