



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Butyriboletus appendiculatus (Schaeffer & Fr.) Arora & Frank

Synonyme : *Boletus appendiculatus*

Nom français : Bolet appendiculé

Sous feuillus, plutôt sur sol peu calcaire. Chapeau feutré, brun rougeâtre à brun roussâtre. Pores jaunes puis jaune verdâtre, bleuissants au toucher. Stipe jaune pâle à brunâtre, avec un réseau concolore plus ou moins développé, base atténuée et radicante. Chair blanchâtre à jaunâtre, rougeâtre sale vers la base du stipe, sans bleuissement ou très subtilement au-dessus des tubes. Spores 12-15,5 x 4,5-5 µm.

B. subappendiculatus est un véritable sosie lié aux sapins (*Abies*).

Pour la région, à comparer avec *B. pseudoregius* et *B. fechtneri* qui bleuissent plus nettement dans le chapeau à la coupe.

Espèce rare sur nos secteurs de prospection, probablement à tendance trop calcaire, elle semble plus facile à rencontrer en Charente ou dans les Deux-Sèvres avec présence de châtaigniers. Les récoltes présentées ici proviennent des secteurs de Préguiillac (17) et Brigueuil (16).

Biblio : littérature courante.

