



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

Mycopan scabripes (Murrill) Redhead et coll.


Synonyme : *Hydropus scabripes*

En forêt, parfois sur bois. Chapeau 1,5-4 cm, brun noirâtre à gris-noir, strié, avec le centre papillé et plus sombre. Lames blanchâtres à légèrement grisâtres, assez espacées, tachées de brun-jaune avec l'âge. Stipe pruneux à finement squamuleux, plus ou moins couvert de fibrilles grises, grisonnant à brunissant par la base. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-11 x 4-7 μm , amyloïdes. Basides bi- ou tétrasporiques. Présence de nombreuses et grandes cheilo- et pleurocystides (60-100 μm), cylindriques à sublagéniformes, avec un contenu plus ou moins granuleux (surtout dans la partie supérieure).

A noter une certaine ressemblance avec *Mycena atropapillata* à stipe lisse, spores non amyloïdes, cystides plus petites sans contenu granuleux et épicutis avec des hyphes diverticulées.

Espèce probablement peu fréquente dans la région, nous l'avons récoltée dans une allée sous épicéas à Gémozac (photographies ci-dessus), et sous feuillus à Berneuil (photographie page 2).

Biblio : GEPR.



cheilos