



Ordre : Tricholomatales

Famille : Mycenaceae

## *Mycena capillaripes* Peck

Nom français : Mycène à pied chevelu

En troupe sur les aiguilles de conifères, plus rarement sous feuillus. Chapeau brun-gris à brun rougeâtre, hygrophane et très pâle en séchant. Lames blanchâtres à gris crème, bordées de brun-rouge. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur alcaline forte. Spores 8-11,5 x 4,5-6 µm. Hyphes du stipe diverticulées.

A comparer avec :

- *M. rubromarginata* : sur bois, odeur sans particularité, spores nettement plus larges ;
- *M. schildiana* : espèce des régions méditerranéennes à chapeau généralement plus pâle, spores plus petites (7-9,5 x 4,5-5,5 µm) et hyphes du stipe lisses ;
- *M. zephirus* : parmi les aiguilles de conifères, chapeau brun puis grisâtre et maculé, arête des lames concolore, odeur légère de rave.

Cette mycène est très fréquente et pousse par centaines d'exemplaires sur la période septembre/décembre. Nous la rencontrons parmi les aiguilles de pin, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres, et parfois sous d'autres conifères tels que cèdres ou épicéas.

Biblio : littérature courante - Mycena d'Europa G. Robich.

