



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Crepidotaceae*

## *Crepidotus applanatus* (Pers. : Fr.) Kummer

Nom français : Crépidote aplani

Sur bois pourri et débris ligneux, surtout de feuillus. Chapeau hygrophane, blanchâtre à beige ochracé sale. Lames blanches puis brun argilacé terne. Spores 4,9-6  $\mu$ m, verruqueuses. Cheilocystides clavées à capitées.

A comparer avec :

- *C. malachus*, véritable sosie à spores 5,9-7,3  $\mu$ m, donc légèrement plus grandes ;
- *C. malachus* var. *trichifer* : sur conifères.

Nous rencontrons cette espèce tous les ans entre les mois de mai et de novembre, elle est très fréquente dans la région et fait rarement défaut après une pluie.

Biblio : littérature courante - Il Genere *Crepidotus* in Europa G. Consiglio & L. Setti.

*Fiche réalisée en avril 2019 par Patrice TANCHAUD*



Ici une récolte réalisée en août 2015, en milieu humide, sur bois mort (saule ?) sur la commune de Montendre. Nous avons été surpris par les teintes jaunes de ces exemplaires, mais la microscopie, et notamment les spores mesurant  $4,8-5,8 \mu\text{m}$ , ne nous ont pas permis de retenir un autre taxon qui aurait plus ressemblé, par exemple *C. ehrendorferi*.