



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius pallidogriseus Bidaud & Reumaux

Sous conifères. Chapeau visqueux, gris souris ou gris perle, se maculant de brun-jaune à partir du disque. Lames brun-gris à brun noirâtre à reflets violetés. Stipe fibrilleux, gris à ocre jaune, sommet bleuté, base bulbeuse. Chair blanc sale, grisâtre au sommet du stipe. Odeur fruitée, saveur amère. TL4 jaune d'or sur cuticule, gaïac bleu-vert sur chair. Spores 7,5-9 x 6-6,5 µm. Dans la même Section *Infracti*, à comparer surtout avec *C. anfractoides*, mais la chair de ce dernier ne réagit que très peu ou pas du tout au gaïac.

Les exemplaires présentés ont été observés en novembre 2014, sous chênes sur sol calcaire à Saintes. Au vu des teintes du chapeau, des réactions macrochimiques, jaune au TL4 et vive au gaïac, le taxon le plus approprié semble celui décrit ici, avec une écologie qui serait donc plus large que celle mentionnée dans la littérature.

Biblio : ADC Bidaud et al.- GEPR p. 760 (sous *C. anfractoides*).

Fiche réalisée en août 2016 par Patrice TANCHAUD