



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

## *Cortinarius armillifer* Moëgne-L. et Reum.

Sous feuillus. Chapeau 3-4 cm, conique, avec un mamelon obtus très marqué, ocre orangé, plus clair vers la marge qui est recouverte d'un fin voile blanc. Lames peu serrées, ocre fauve. Stipe blanchâtre, brunissant, garni d'un voile blanc formant un anneau armilliforme au sommet, base pointue. Chair jaunâtre. Odeur terreuse. Spores 6,5-8 x 5-6  $\mu\text{m}$ , subglobuleuses.

Notre récolte a été réalisée en octobre 2019, sous chênes, charmes et saules, dans un bois autour de Sainte. Déterminer un cortinaire de cette Section infernale des *Hinnulei* n'est pas une mince affaire, d'autant plus que des études biomoléculaires paraissent aujourd'hui indispensables pour tenter d'y voir peut-être un jour plus clair. Pour le cas qui nous intéresse ici, les petites spores observées (7-8 x 5-6  $\mu\text{m}$ ) limitent considérablement le choix, sinon c'est probablement vers *C. lacustris* (spores 8-11 x 5-7  $\mu\text{m}$ ) que nous nous serions orienté.

Biblio : ADC Bidaud et al.

*Fiche réalisée en mars 2020 par Patrice TANCHAUD*