



Ordre : Cortinariales

Famille : Cortinariaceae

Cortinarius chrysolitus Kauffman

Synonyme : *C. palustris* ss. auct.

En tourbière parmi les sphaignes avec présence de pins, épicéas ou bouleaux. Chapeau 3-6 cm, feutré à laineux, brun verdâtre à brun-jaune châtain. Lames verdâtres à reflets bleus dans la jeunesse. Stipe jaune-vert, jaune pâle à jaune grisâtre, surtout dans la moitié inférieure, guirlandé de fibrilles roux olivacé. Chair jaunâtre, plus brun-jaune dans le bas du stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7,5-10 x 5-6 µm.

Avec une écologie similaire, à comparer avec :

- *C. huronensis* : lames jaune moutarde jamais bleues, stipe couvert d'un voile brun rougeâtre avec la base orange saumoné ;
- *C. subfusipes* : chapeau brun rougeâtre, stipe jaunâtre et fibrilleux.

Ce cortinaire, caractérisé par des tons majoritairement olivâtres sur l'ensemble du sporophore, est probablement peu fréquent, encore faut-il être présent au bon moment dans son écologie de prédilection, d'ailleurs rare dans notre dition. Cette récolte a été réalisée en octobre 2014 en forêt de Brigueuil, les spores mesuraient 7,5-9 x 5 µm.

Biblio : ADC Bidaud et al.